

INTOXICACIONES



AGENTES TÓXICOS Y SUS ANTÍDOTOS




AGENTES TÓXICOS Y SUS ANTÍDOTOS

TOXICO	ANTIDOTO	ANTIDOTO
Paracetamol	N-acetilcisteína	
Opioides (e.g., morfina, heroína)	Naloxona	
Benzodiazepinas	Flumazenil	
Metanol y etilenglicol	Fomepizol o etanol	
Organofosforados (plaguicidas)	Atropina y pralidoxima	

AGENTES TÓXICOS Y SUS ANTÍDOTOS

TOXICO	ANTIDOTO	ANTIDOTO
Carbamatos (plaguicidas)	Atropina	
Cianuro	Hidroxocobalamina o nitrito de sodio seguido de tiosulfato de sodio	
Monóxido de carbono	Oxígeno al 100% o terapia con oxígeno hiperbárico	
Hierro	Deferoxamina	
Plomo	EDTA cálcico disódico o dimercaprol	

AGENTES TÓXICOS Y SUS ANTÍDOTOS

TOXICO	ANTIDOTO	ANTIDOTO
Mercurio	Dimercaprol o succímero	
Cobre	Penicilamina	
Arsénico	Dimercaprol	
Flúor	Gluconato de calcio	
Litio	No hay antídoto específico; manejo sintomático y hemodiálisis si necesario	

AGENTES TÓXICOS Y SUS ANTÍDOTOS

TOXICO	ANTIDOTO	ANTIDOTO
Antidepresivos tricíclicos	Bicarbonato de sodio	
Beta-bloqueadores	Glucagón	
Bloqueadores de canales de calcio	Gluconato de calcio, insulina euglicémica y glucosa	
Digoxina	Fragmentos de anticuerpos específicos (Fab de digoxina)	
Sulfonilureas (hipoglicemiantes)	Glucosa intravenosa y octreótido	

AGENTES TÓXICOS Y SUS ANTÍDOTOS

TOXICO	ANTIDOTO	ANTIDOTO
Warfarina (anticoagulante)	Vitamina K	
Heparina	Protamina	
Toxina botulínica	Antitoxina botulínica (disponible en centros especializados)	
Serpientes venenosas	Suero antiofídico específico	
Araña viuda negra (Latrodectus)	Antitoxina latrodectus	

TOXICOS Y SUS TIEMPOS - DOSIS




TOXICOS Y SUS TIEMPOS

TOXICO	TIEMPO	RECOMENDACIÓN
PARACETAMOL	8 HORAS	ADMINISTRAR N-ACETILCISTEÍNA
ORGANOFOSFORADOS	INMEDIATO	ADMINISTRAR ATROPINA Y PRALIDOXIM
BENZODIACEPINAS Y ANTIDEPRESIVOS	4 - 6 HORAS	ESTABILIZACIÓN INMEDIATA DEL PACIENTE
MONÓXIDO DE CARBONO (CO)	INMEDIATO	ADMINISTRAR OXÍGENO AL 100%
METANOL O ETILENGLICOL	6 - 8 HORAS	ADMINISTRAR ETANOL O FOMEPIZOL
COCAINA	INMEDIATO - 2 HORAS	CONTROL DE AGITACIÓN CON BENZODIACEPINAS
MARIHUANA THC	INTOXICACIONES LEVES NO SON TIEMPO-DEPENDIENTES	MANEJO SINTOMÁTICO. HIDRATACIÓN Y CONTROL DE VÓMITOS
ALCOHOL	INMEDIATO SI HAY RIESGO DE DEPRESIÓN RESPIRATORIA	ESTABILIZACIÓN DE VÍA AÉREA Y SOPORTE HEMODINÁMICO
FENTANILO Y OTROS OPIOIDES	PRIMEROS 15 MINUTOS	ADMINISTRAR NALOXONA (ANTÍDOTO)

FARMACOS Y SUS DOSIS


FARMACO	DOSIS RECOMENDADA	DOSIS TOXICA
PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN)	HASTA 4.000 MG AL DÍA EN ADULTOS	INGESTA AGUDA SUPERIOR A 7.500 MG EN ADULTOS O MÁS DE 150 MG/KG EN NIÑOS
QUETIAPINA	ENTRE 150 Y 800 MG AL DÍA	MÁS DE 1.500 MG
ZOPICLONA	7,5 MG AL DÍA PARA ADULTOS.	INGESTA DE MÁS DE 10-20 MG/KG
CLONAZEPAM	GENERALMENTE ENTRE 0,5 Y 4 MG AL DÍA	MÁS DE 20 MG
MELATONINA	ENTRE 0,5 Y 5 MG	INGESTAS SUPERIORES A 30 MG

TOXIDROME



¿QUE ES TOXIDROME?


**GRUPO DE SIGNOS Y SINTOMAS
CLINICOS ASOCIADOS A UNA
INGESTION O EXPOSICIÓN TÓXICA**



TOXIDROME	FRECUENCIA CARDIACA Y PRESIÓN ARTERIAL	FRECUENCIA RESPIRATORIA	PUPILAS	PERISTALSIS	TEMPERATURA	DIAFORESIS
COLINERGICO	SIN CAMBIOS	SIN CAMBIOS	MIOSIS	AUMENTADA	SIN CAMBIOS	POSITIVA
ANTICOLINERGICO	AUMENTADA	SIN CAMBIOS	MIDRIASIS	DISMINUIDA	AUMENTADA	NEGATIVA
SIMPATOMIMETICOS	AUMENTADA	AUMENTADA	MIDRIASIS	AUMENTADA	AUMENTADA	POSITIVA
HIPNOTICO/SED ANTE	DISMINUIDA	DISMINUIDA	SIN CAMBIOS - MIOSIS	DISMINUIDA	DISMINUIDA	NEGATIVA

ALGORITMO DE MANEJO CLINICO EN PACIENTE INTOXICADO





CARBON ACTIVADO



SUSTANCIAS CON INDICACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO EN DOSIS ÚNICA Y MÚLTIPLES.

DOSIS UNICA	MÚLTIPLES DOSIS
CIANURO	DAPSONA
COLCHICINA	ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS
BLOQUEADORES DE CANAL DE CALCIO	DIGOXINA
ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS	CARBAMAZEPINAS
GLUCOSIDOS CARDIACOS (DIGITALICOS)	FENOBARBITAL/FENITOINA
SALICILATOS	QUININA
	SALICILATOS
	TEOFILINA
	FARMACOS CON ABSORCION/DISOLUCION RETARDADA
	TOXICOS DE LIBERACION PROLONGADA



VISÍTANOS EN WWW.FORSAMAULE.CL